

# ビロイ+XELOX(ゼローダ・エルプラット)療法

ビロイ+XELOX 療法の投与スケジュール		3週間		
		1日目	8日目	15日目
ビロイ	(注射)	●		
エルプラット	(注射)	●		
ゼローダ	(内服)	1日2回 1000mg/m <sup>2</sup> /回 2投1休 (14日間服用、7日間休薬)		

3週間ごとに繰り返します。

## 制吐対策(高度催吐性リスク)

1日目 アロカリス注、パロノセトロン(アロキシ)注、デカドロン注

主治医の判断によって、デカドロン錠やオランザピン錠が追加される場合もあります。

## ※ゼローダの投与量

体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後 30 分以内に 1 日 2 回、14 日間連日経口投与し、その後 7 日間休薬する。これを 1 コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1 回用量
1.36m <sup>2</sup> 未満	1,200 mg
1.36m <sup>2</sup> 以上 1.66m <sup>2</sup> 未満	1,500 mg
1.66m <sup>2</sup> 以上 1.96m <sup>2</sup> 未満	1,800 mg
1.96m <sup>2</sup> 以上	2,100 mg