

# ビロイ+SOX(S-1・エルプラット)療法

ビロイ+SOX 療法の投与スケジュール		3週間	
	1日目	8日目	15日目
ビロイ (注射)	●		
エルプラット (注射)	●		
S-1 (内服)	1日2回 40mg/m <sup>2</sup> /回 2投1休 (14日間服用、7日間休薬)		

3週間ごとに繰り返します。

## 制吐対策(高度催吐性リスク)

1日目 アロカリス注、パロノセトロン(アロキシ)注、デカドロン注

主治医の判断によって、デカドロン錠やオランザピン錠が追加される場合もあります。

## ※S-1の用量について

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

なお、患者の状態により適宜増減する。増減量の段階を 40mg、50mg、60mg、75mg/回とする。増量は本剤の投与によると判断される臨床検査値異常(血液検査、肝・腎機能検査)及び消化器症状が発現せず、安全性に問題がなく、増量できると判断される場合に初回基準量から一段階までとし、75mg/回を限度とする。